



Información de las vacunas no financiadas, no incluidas en el calendario de vacunaciones sistemáticas del Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Vacuna intranasal contra la gripe.

El Departament de Salut indica y financia las vacunas incluidas en el Calendario de vacunaciones sistemáticas, dirigidas a toda la población, y también aquellas que están indicadas en situaciones de riesgo de manera individual.

Algunos clínicos y sociedades científicas hacen recomendaciones fuera de las indicaciones oficiales. Estas vacunas no están financiadas y necesitan la prescripción médica para ser adquiridas y administradas.

Vacunas disponibles

Vacuna intranasal contra la gripe. Fluenz®Tetra.

La gripe estacional es una afección que anualmente afecta al 5-10% de adultos y al 20-30% de niños. Todos los individuos son susceptibles de contraer la gripe y de padecer sus complicaciones asociadas, siendo las más frecuentes la neumonía y la otitis media. La vacuna Fluenz®Tetra es una vacuna de virus vivos atenuados indicada para la prevención de la gripe en niños y adolescentes a partir de los 24 meses de edad hasta los 18 años. Tiene que administrarse en otoño anualmente (de octubre a diciembre en el hemisferio norte) y antes del inicio de la temporada gripal.

Fluenz®Tetra se administra por vía intranasal, un volumen de 0,2ml. a razón de 0,1 ml. en cada fosa nasal.

Puede producir efectos adversos en algunas personas siendo la mayoría breves y de naturaleza leve. Los más frecuentes son congestión nasal y mucosidad, disminución del apetito, debilidad y dolor de cabeza.

<i>Edad</i>	<i>Inmunización primaria</i>	<i>Intervalos mínimos entre dosis primarias</i>
24 meses a 18 años	1 dosis 2 dosis: niños vacunados por primera vez	- Intervalo mínimo de 4 semanas



Riesgos generales

La administración de cualquier vacuna puede provocar una reacción local. La reacción adversa observada con más frecuencia en los estudios clínicos fue la congestión nasal/rinorrea.

La ficha técnica del producto y el prospecto describen de forma detallada los efectos adversos específicos de cada vacuna.

Precauciones para la conservación de las vacunas

Una vez se ha recibido la recomendación de vacuna no sistemática no financiada por parte de un profesional de la salud, hay que adquirirla en la farmacia con el documento de prescripción correspondiente.

La vacuna hay que mantenerla en el frigorífico, a una temperatura de entre 2 y 8°C y no dejarla nunca a temperatura ambiente. Las vacunas no pueden tocar la pared posterior del frigorífico y tampoco hay que almacenarlas en la puerta. Se tienen que transportar en bolsas refrigeradas evitando el contacto directo con los acumuladores que deben estar fríos pero no congelados. No exponer las vacunas a la luz ni a fuentes de calor. La rotura de la cadena de frío puede suponer la pérdida de efectividad de la vacuna.

Para mayor información:

<http://www.vacunas.org/gripe-2/>

<http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-26>