



## Información de las vacunas no financiadas, no incluidas en el calendario de vacunaciones sistemáticas del Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

### Vacuna conjugada contra el neumococo

El Departament de Salut indica y financia las vacunas incluidas en el Calendario de vacunaciones sistemáticas, dirigidas a toda la población, y también aquellas que están indicadas en situaciones de riesgo de manera individual.

Algunos clínicos y sociedades científicas hacen recomendaciones fuera de las indicaciones oficiales. Estas vacunas no están financiadas y necesitan la prescripción médica para ser adquiridas y administradas.

### Vacunas disponibles

Actualmente se comercializa la vacuna **Prevenar<sup>®</sup>13** (13 serotipos de neumococo-VNC13), autorizada a partir de las 6 semanas de vida sin límite superior de edad y **Synflorix<sup>®</sup>** (10 serotipos de neumococo-VNC10) autorizada a partir de las 6 semanas de vida hasta los 5 años de edad.

El neumococo es una bacteria con más de 90 serotipos. Aun cuando la vacuna no protege contra todos ellos, sí lo hace contra los más prevalentes y contra los que más infecciones producen en las edades más extremas de la vida y en personas con la inmunidad alterada. Estas infecciones pueden ser graves: meningitis, bacteriemia y neumonía

Las vacunas disponibles son muy seguras y eficaces. La vacunación completa puede requerir varias dosis y por ello hay que administrar siempre el mismo preparado comercial.

El calendario de vacunaciones sistemáticas indica y financia la vacunación contra el neumococo en niños nacidos a partir del 1 de enero de 2016. También está financiada para grupos de riesgo específicos (consulte a su médico o enfermera)

Las recomendaciones de las sociedades científicas son, según la edad de inicio de la vacunación:

Edad	Inmunización primaria	Intervalos mínimos entre dosis primarias	Dosis de recuerdo	Número total dosis
6 semanas a 6 meses	2 dosis calendario sistemático (caso de Catalunya) (VNC10/VNC13)  3 dosis si no calendario sistemático (VNC10/VNC13)	1 mes	Si, a los 11-15 meses Al menos 6 meses desde la última dosis	3 si calendario sistemático (caso de Catalunya) 4 si no calendario sistemático



7 a 11 meses	2 dosis (VNC10/VNC13)	1 mes	Si, el segundo año de vida Al menos 2 meses desde la última dosis	3
12 a 23 meses	1 dosis (VNC10/VNC13)	-	Si, separadas como mínimo per un intervalo de 2 meses	2
2 a 5 años	1 dosis VNC13 1 dosis VNC10	-	No en VCN13 Sí en VCN10, separadas intervalo mínimo 2 meses	1 para VNC13 2 para VNC10
6 a 17 años	1 dosis VNC13	-	-	1
≥ 18 años	1 dosis VNC13	-	-	1

### Riesgos generales

---

La administración de cualquier vacuna puede provocar una reacción local con enrojecimiento, edema, dolor o fiebre.

En raras ocasiones pueden producir una reacción grave que requiera algún tipo de tratamiento. La ficha técnica del producto y el prospecto describen de forma detallada los efectos adversos específicos de cada vacuna.

### Precauciones para la conservación de las vacunas

---

Una vez se ha recibido la recomendación de vacuna no sistemática no financiada por parte de un profesional de la salud, hay que adquirirla en la farmacia con el documento de prescripción correspondiente.

La vacuna hay que mantenerla en el frigorífico, a una temperatura de entre 2 y 8°C y no dejarla nunca a temperatura ambiente. Las vacunas no pueden tocar la pared posterior del frigorífico y tampoco hay que almacenarlas en la puerta. Se tienen que transportar en bolsas refrigeradas evitando el contacto directo con los acumuladores que deben estar fríos pero no congelados. No exponer las vacunas a la luz ni a fuentes de calor. La rotura de la cadena de frío puede suponer la pérdida de efectividad de la vacuna.

Para mayor información:

<http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Pneumonia-00001>

<http://www.vacunas.org/enfermedad-neumococica/>