



Información de las vacunas no financiadas, no incluidas en el calendario de vacunaciones sistemáticas del Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Vacuna contra el rotavirus

El Departament de Salut indica y financia las vacunas incluidas en el Calendario de vacunaciones sistemáticas, dirigidas a toda la población, y también aquellas que están indicadas en situaciones de riesgo de manera individual.

Algunos clínicos y sociedades científicas hacen recomendaciones fuera de las indicaciones oficiales. Estas vacunas no están financiadas y necesitan la prescripción médica para ser adquiridas y administradas.

Vacunas disponibles

El rotavirus es una de las principales y más frecuentes causa de diarrea en los primeros años de vida y afecta principalmente a niños menores de 5 años de edad. Las vacunas disponibles han demostrado su seguridad y eficacia

Están comercializadas dos vacunas, Rotateq® y Rotarix®.

Rotateq®: rotavirus tipo G1, G2, G3, G4, P1A humano-bovino (virus atenuados)

Se administran 3 dosis per vía oral. La primera dosis hay que administrarla entre las 6 y las 12 semanas de vida y la última antes de las 32 semanas, separadas como mínimo 4 semanas entre ellas

<i>Edad</i>	<i>Inmunización primaria</i>	<i>Intervalos mínimos entre dosis primarias</i>	<i>Dosis recuerdo</i>
6 semanas a 32 semanas	3 dosis	4 semanas	No

Rotarix®: Cepa rotavirus humano RIX4414 (virus vivos atenuados)

Se administran 2 dosis por vía oral. La segunda dosis preferentemente antes de las 16 semanas y la vacunación debe estar finalizada a las 24 semanas de vida.

<i>Edad</i>	<i>Inmunización primaria</i>	<i>Intervalos mínimos entre dosis primarias</i>	<i>Dosis recuerdo</i>
6 semanas a 24 semanas	2 dosis	4 semanas	No



Riesgos generales

La ficha técnica del producto y el prospecto describen de forma detallada los efectos adversos específicos de cada vacuna.

Precauciones para la conservación de las vacunas

Una vez se ha recibido la recomendación de vacuna no sistemática no financiada por parte de un profesional de la salud, hay que adquirirla en la farmacia con el documento de prescripción correspondiente.

La vacuna hay que mantenerla en el frigorífico, a una temperatura de entre 2 y 8°C y no dejarla nunca a temperatura ambiente. Las vacunas no pueden tocar la pared posterior del frigorífico y tampoco hay que almacenarlas en la puerta. Se tienen que transportar en bolsas refrigeradas evitando el contacto directo con los acumuladores que deben estar fríos pero no congelados. No exponer las vacunas a la luz ni a fuentes de calor. La rotura de la cadena de frío puede suponer la pérdida de efectividad de la vacuna.

Para mayor información:

<http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Rotavirus>

<http://www.vacunas.org/rotavirus-2/>