



Información de las vacunas no financiadas, no incluidas en el calendario de vacunaciones sistemáticas del Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Vacuna contra el virus de la varicela

El Departament de Salut indica y financia las vacunas incluidas en el Calendario de vacunaciones sistemáticas, dirigidas a toda la población, y también aquellas que están indicadas en situaciones de riesgo de manera individual.

Algunos clínicos y sociedades científicas hacen recomendaciones fuera de las indicaciones oficiales. Estas vacunas no están financiadas y necesitan la prescripción médica para ser adquiridas y administradas.

Vacunas disponibles

La varicela es una enfermedad que afecta 400.000 personas cada año en el territorio español y comporta una media de 1.500 hospitalizaciones. Es más frecuente en los primeros años de vida. Según el calendario de vacunaciones sistemáticas se recomiendan dos dosis para los niños a partir del 1 de enero de 2016, administradas a los 15 meses y a los 3 años de edad. Para los niños nacidos antes de esta fecha está contemplada la vacunación sistemática a los 11-12 años si no se ha adquirido inmunización natural. Hasta que no alcancen esta edad la vacuna es no sistemática y si no hay otro factor de riesgo que lo indique, tampoco está financiada.

Se comercializan dos vacunas, Varilrix® y Varivax®, ambas seguras y de probada eficacia. Están autorizadas para la inmunización a partir de los 12 meses de edad. No existen datos de la eficacia protectora ni de la respuesta inmune en personas seronegativas mayores de 65 años.

<i>Edad</i>	<i>Número de dosis requeridas</i>	<i>Intervalo mínimo entre la 1a y 2a dosis</i>	<i>Intervalo recomendado entre la 1a y 2a dosis</i>
1-12 años	2	4 semanas	12 semanas

Riesgos generales

La administración de cualquier vacuna puede provocar una reacción local con enrojecimiento, edema, dolor o fiebre.

En raras ocasiones pueden producir una reacción grave que requiera algún tipo de tratamiento. La ficha técnica del producto y el prospecto describen de forma detallada los efectos adversos específicos de cada vacuna.



Precauciones para la conservación de las vacunas

Una vez se ha recibido la recomendación de vacuna no sistemática no financiada por parte de un profesional de la salud, hay que adquirirla en la farmacia con el documento de prescripción correspondiente.

La vacuna hay que mantenerla en el frigorífico, a una temperatura de entre 2 y 8°C y no dejarla nunca a temperatura ambiente. Las vacunas no pueden tocar la pared posterior del frigorífico y tampoco hay que almacenarlas en la puerta. Se tienen que transportar en bolsas refrigeradas evitando el contacto directo con los acumuladores que deben estar fríos pero no congelados. No exponer las vacunas a la luz ni a fuentes de calor. La rotura de la cadena de frío puede suponer la pérdida de efectividad de la vacuna.

Para mayor información:

<http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Varicella>

<http://www.vacunas.org/varicela-2/>