



Información de las vacunas no financiadas, no incluidas en el calendario de vacunaciones sistemáticas del Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH).

El Departament de Salut indica y financia las vacunas incluidas en el Calendario de vacunaciones sistemáticas, dirigidas a toda la población, y también aquellas que están indicadas en situaciones de riesgo de manera individual.

Algunos clínicos y sociedades científicas hacen recomendaciones fuera de las indicaciones oficiales. Estas vacunas no están financiadas y necesitan la prescripción médica para ser adquiridas y administradas.

Vacunas disponibles

Gardasil® (4 serotipos-VPH4), **Gardasil®9** (9 serotipos-VPH9) y **Cervarix®** (2 serotipos-VPH2).

El VPH es un virus común que se propaga a través del contacto sexual. Existen diferentes tipos de VPH y muchos de ellos no causan problemas. Sin embargo, algunas cepas pueden producir cáncer de cuello de útero y verrugas genitales. La vacuna contra el VPH protege contra serogrupos causantes de la mayoría de cánceres de cuello de útero. Contra 2 en el caso de Cervarix® y Gardasil® y contra 7 en el caso de Gardasil®9. La vacuna Gardasil® i Gardasil®9 además protegen de las verrugas genitales. El VPH también es el responsable de cierta patología oncológica, como el cáncer de pene, de ano, de garganta, etc.

Según el calendario de vacunaciones sistemáticas de Catalunya se recomienda que las niñas de 11-12 años reciban dos dosis de vacuna con un intervalo de 6 meses entre ellas. Se recomienda y financia también a mujeres y hombres de ciertos grupos de riesgo (pregunte a su médico o enfermera)

Las recomendaciones de las sociedades científicas son:

Gardasil® (4 serotipos- VPH4)

Edad	Sexo	Inmunización primaria	Intervalos entre dosis
9-13 años	Mujer	2 dosis	0-6 meses
9-13 años	Hombre	2 dosis	0-6 meses
14-45 años	Mujer	3 dosis	0-2-6 meses
14-26 años	Hombre	3 dosis	0-2-6 meses



Gardasil®9 (9 serotipos- VPH4)

Edad	Sexo	Inmunización primaria	Intervalos entre dosis
9-14 años	Mujer	2 dosis	0-6 meses
9-14 años	Hombre	2 dosis	0-6 meses
15-45 años	Mujer	3 dosis	0-2-6 meses
15-26 años	Hombre	3 dosis	0-2-6 meses

Cervarix® (2 serotipos- VPH2)

Edad	Sexo	Inmunización primaria	Intervalos entre dosis
9-14 años	Mujer	2 dosis	0-6 meses
15-55 años	Mujer	3 dosis	0-1-6 meses

Riesgos generales

La administración de cualquier vacuna puede provocar una reacción local con enrojecimiento, edema, dolor o fiebre.

En raras ocasiones pueden producir una reacción grave que requiera algún tipo de tratamiento. La ficha técnica del producto y el prospecto describen de forma detallada los efectos adversos específicos de cada vacuna.

Precauciones para la conservación de las vacunas

Una vez se ha recibido la recomendación de vacuna no sistemática y no financiada por parte de un profesional de la salud, hay que adquirirla en la farmacia con el documento de prescripción correspondiente.

La vacuna hay que mantenerla en el frigorífico, a una temperatura de entre 2 y 8°C y no dejarla nunca a temperatura ambiente. Las vacunas no pueden tocar la pared posterior del frigorífico y tampoco hay que almacenarlas en la puerta. Se tienen que transportar en bolsas refrigeradas evitando el contacto directo con los acumuladores que deben estar fríos pero no congelados. No exponer las vacunas a la luz ni a fuentes de calor. La rotura de la cadena de frío puede suponer la pérdida de efectividad de la vacuna.

Para mayor información:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Papilloma_huma

<http://www.vacunas.org/virus-del-papiloma-humano/>